



Legemiddel i blanding til bruk i subkutan infusjonspumpe

Legemiddel i infusjonspumpe til subkutan bruk blir vanlegvis tatt i bruk når orale og/eller transdermale legemiddel ikke er hensiktsmessige, gir ikkje-tolererbare biverknader eller ikke gir god nok effekt.

Fleire legemiddel i blanding

I behandlingsalgoritmane «[Symptomlindring i livets sluttfase](#)» for morfin, midazolam, haloperidol og glykopyrron har det tidlegare vore angitt bruk i subkutan infusjonspumpe dersom behovet for desse legemidla blir meir langvarig. Vanlegvis består slike infusjonar av eitt eller fleire av desse legemidla, eller legemiddel i tilsvarande gruppe, i tillegg til eventuell fortynningsvæske (natriumklorid 9 mg/ml eller glukose 50 mg/ml). Når ulike legemiddel blir blanda medfører dette risiko for uforlikelegheiter og redusert stabilitet av dei ulike legemidla. Uforlikelegheiter kan gi utfellingar som kan tette kanylen, gi irritasjon på injeksjonsstaden og/eller absorpsjonen av legemiddelet kan bli endra. Det er derfor ikke anbefalt å blande fleire enn to til tre legemiddel i same blanding.

Fleire legemiddel i blanding gjer det også vanskelegare å tilpasse dosering av dei enkelte legemidla, sidan blandingsforholdet er fast. Endring i infusjonshastighet vil gi endra dose av alle legemidla i blandinga. Legemiddel med lang halveringstid kan ein vurdere å gi som subkutane injeksjonar utanom og såleis unngå å ha dei i legemiddelblandinga (som til dømes deksametason).

I slike legemiddelblandingar blir det brukt injeksjonsvæsker, mange av desse er berre godkjende til intravenøs eller intramuskulær bruk i Norge. Det er likevel vanleg – og nødvendig, å bruke desse injeksjonsvæskene til subkutane infusjonar.

Gode oppslagsverk for legemiddel til subkutan bruk til palliative pasientar er blant anna Palliative Care Formulary (tilgjengeleg både som [bok](#) og som database: www.medicinescomplete.com (krev innlogging) og [The Syringe Driver, Continuous Subcutaneous Infusions in Palliative Care](#).

Omrekning av dosar

Ved oppstart av subkutane infusjonar må dosane reknast om frå perorale dosar til parenterale dosar, det kan vere noko forskjell mellom subkutane og intravenøse dosar. Slike konverteringstabellar er rettleiande, responsen på ulike opioid kan variere mellom pasientar og doseringa må optimaliserast til den enkelte etter skifte av opioid og/eller administrasjonsveg. Det må også takast omsyn til om andre legemiddel som blir tilsette i blandinga har «opioidsparande» effekt.

**Omrekningstabellar – OPIOID:**

Smertealgoritme, Symptomlindring i livets sluttfase, KLB 2021.

Ekvianalgetisk potens i forhold til peroral morfin, tabell 4.2, kap. 4 Symptomer og tilstander.
Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen (14.10.2019).

HELFOs omrekningstabell til orale morfinekvivalentar, [OMEQ](#).

Ekvianagetiske doser av opioidalagetika og virketid, tabell 1, kap. L20 Smertestillende legemidler. Norsk Legemiddelhåndbok.

[Veilede konverteringstabell for opioider ved palliasjon](#), februar 2021. Håndbok i lindrende behandling, Lindring i nord.

Tabellar i Palliative Care Formulary, www.medicinescomplete.com (krev innlogging, finst også som bok)

Omrekningstabellar – STEROID:

[Glukokortikoider til systemisk bruk](#), tabell 2, kap. L3 Legemidler i endokrinologien. Norsk Legemiddelhåndbok.

Tabell i [Håndbok i lindrende behandling](#) (side 10), Lindring i nord (sist oppdater 2012).

Tabell i Palliative Care Formulary, www.medicinescomplete.com (krev innlogging, finst også som bok)

Oppdatert januar 2022.